



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Académico Profesional de Obstetricia

**Complicaciones perinatales de la pre-eclampsia en
gestantes adolescentes y gestantes adultas. Hospital
Nacional Daniel Alcides Carrión, 2008-2010**

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

AUTORES

Jackelin Noelia ANTICONA YAURI

Rabin Jair PAREDES COLÁN

ASESOR

Dora Nancy RODRÍGUEZ MICHUY

Lima, Perú

2012

RESUMEN

Complicaciones perinatales de la pre-eclampsia en gestantes adolescentes y gestantes adultas. HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN. 2008 – 2010

Objetivo: Describir las complicaciones de la Pre-eclampsia que se presentan con mayor frecuencia en gestantes adolescentes y gestantes adultas en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión – Callao, durante el periodo 2008 a 2010.

Material y Métodos: Estudio descriptivo, de corte transversal y retrospectivo en el cual se revisaron las historias clínicas de pacientes cuyo parto fue atendido en el servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante el periodo 2008 - 2010. Se revisó un total de 528 historias clínicas, entrando en el estudio 487 historias, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. El muestreo realizado fue no probabilístico por conveniencia.

Resultados: En el grupo de adolescentes la complicación más frecuente fue la Preeclampsia severa, con 85 casos, seguida por la eclampsia con 11 casos y en tercer lugar el síndrome HELLP. En el grupo de adultas la complicación más frecuente fue también la preeclampsia severa con 299 casos, seguida las alteraciones de la coagulación con 55 casos, y por el síndrome HELLP con 44 casos. Además, durante el tiempo estudiado se presentaron 10 muertes maternas, 8 de estas a causa de las complicaciones derivadas de la preeclampsia.

Conclusión: En el caso de las gestantes adolescentes las principales complicaciones fueron la preeclampsia severa 76.5%, la restricción del crecimiento intrauterino con 27.1% y 9% el sufrimiento fetal agudo. En el grupo de gestantes adultas, las principales complicaciones fueron la preeclampsia severa con 79.5%, seguida de la restricción del crecimiento intrauterino con 19.1% y la alteración de la coagulación con 16.5%.